

Menetrux-en-Joux – Sortie annuelle du groupe « Besain » - Vendredi Après-midi le 11.octobre.2019

Lieu : Menetrux-en-Joux –Bois de Herse : Feuillus (Hêtres, Charmes, Chênes, Noisetiers, érables) et de Conifères mêlés (Sapins et épicéas)

Armillaria bulbosa – Court. N°317 « Gallica » - Essart. P.486 - Chapeau couvert de mèches brun-jaune à jaune vif sur fond de brun ochracé – Pied bulbeux à base jaune +- vif, avec un anneau cotonneux mince et fragile

Armillaria cepistipes – Court., N°315 – (Armillaire pied-bot)

Calocera viscosa – Bon, p.324

Clavariadelphus pistillaris – Bon, p.308 – (Clavaire en pilon)

Clavulina cristata – Essart & Roux, p.1010 – Dans les bois de feuillus et de conifères, souvent en grands groupes

Clitocybe fragrans – Boin, p.138 – Chapeau creux, ombiliqué, à marge striée, brun jaunâtre – Odeur anisée pure et forte

Clitocybe gibba – Bon, p.134 – Chapeau crème à ochracé, déprimé – Lames fortement décurrentes – Chair à odeur de flouve ou cyanique comme les Marasmius oreades - C

Clitocybe nebularis - Bon, p.136 – Odeur forte de pleurote ou de poulailler

Clitocybe phaeophalma – Bon, p.140 – Odeur spéciale dite de « poulailler » ou de « plumes mouillées »

Clitocybe Phyllophila – Bon, p.136 – Chapeau blanchâtre givré – Aspect cérusé – Lames serrées blanches – Chair blanchâtre à odeur farineuse ou spermatique

Clitocybula lacerata – Bon, p.130 – Chapeau ombiliqué, à centre moucheté de gris brun et couvert de fibrilles lacérées vers l'extérieur – Lames subadnées et interveinées – Sur débris de conifères – Odeur de gant de toilette séchant

Clitopilus prunus – (Meunier) – Bon, p.188 – Chapeau à revêtement mat subvelouté, blanchâtre, à marge enroulée – Lames décurrentes, blanches puis roses – Pied concolore au chapeau, évasé sous les lames – chair fragile et cassante – Odeur et saveur de farine mouillée – C. Attention ! Ne pas confondre avec les clitocybes blancs toxiques : Voir dans Essart & Roux, pages (552-554)

Collybia confluens – Bon, p.178 – Chapeau beige incarnat à brunâtre – lames très serrées, denticulées – Stipe à pruine gris lilacin – Odeur coumarinique

Collybia dryophylla – Bon, p.178 –

Collybia peronata (Collybie guêtrée) - Bon, p.178 – Chapeau ochracé brunâtre – Lames espacées et étroites – Stipe concolore couvert de laine hirsute jaunâtre à partir de la base – odeur vinaigrée au froissement et saveur poivrée

Coprinus atramentarius – (Coprins noir d'encre) - Bon, p.270

– Bon, p.272 – Chapeau campanulé, fauvâtre à centre saupoudré de granules ochracées – En touffe

Cortinarius atrovirens – (Cortinaire vert foncé) - Court., N°1193 – Chapeau olive foncé au centre tirant sur le jaune vers les bords – Lames jaunes souffré puis brun olive rouillé – Stipe jaune soufre à jaune olivâtre – Chair jaune vif – odeur poivrée – sous conifères(Sapin)

Cortinarius limonius – Court., N°1100 – Chapeau subsquamuleux, fauve roussâtre puis jaune – Lames jaune-fauve – Fibrilles pelucheuses jaune sur le stipe – Chair ocre-jaune à roux – odeur subraphanoïde

Crepidotus Mollis – Bon, p.244 – Cuticule séparable du chapeau

Différence avec viscosa - Bon, p.182 – Taches rouillées sur le chapeau -

Gastrum sessile – Bon, p.302

Gymnopilus penetrans – Bon, p.244

Hebeloma sinapizans – Bon, p.228 – Chapeau brun roux à beige roussâtre, un peu visqueux – Lames échanquées, crème brunâtre – Pied blanchâtre, prumineux vers le haut vite creux, avec une mèche sommitale (pointe vers le bas ou pi de la vache)

Hygrophorus pudorinus – Bon, p.114 – Chapeau oranger pâle à fauve, visqueux – Charnu - Lames et stipe subconcolores – le stipe a des ponctuations glutineuses et fibrilles orangées – Odeur de résine voir de térébenthine – Saveur idem – Sous conifères en particulier les sapins

Hypholoma capnoïdes – Bon, p.252 – C

Hypholoma fasciculare – Bon, p.252 – T

Inocybe corydalina – Bon, p.236 – Chapeau blanchâtre terne fibrilleux, avec un disque olivâtre – Lames grisâtres – Odeur de poire ou eau de vie de poire ou de baume du Pérou comme *Inocybe bongardii*

Kuehneromyces mutabilis – (Pholliote changeante) – Bon, p.254 – Chapeau très hygrophane, brun cannelle pâissant – Lames roussâtres – Stipe avec une armille floconneuse – En touffe sur souche – C - Non farineux différent de *Galerina marginata* au goût de farine et à l'odeur de farine- Mortel

Lacrymaria lacrymabunda – (Psathyrelle ou Lacrymaire velouté) - Court., N°782 – Chapeau fibrilleux-pelucheux, roux-brunâtre – Cortine abondante noircie par les spores – Souvent en touffe

Lactarius salmonicolor – Bon, p.80 – Lié au sapin – Stipe avec strobicules – Ne verdit pas

Leccinum aurantiacum – Bon, p.40

Lepiota cristata – Bon, p.284 – Court., N°674 – Chapeau 4cm maxi – Calotte brun roux avec écailles concentriques – Stipe vineux en bas – Anneau blanc fugace – odeur vireuse acidulée

Leucocortinarius bulbiger – Court., N°644 – Chapeau très convexe, beige carné – Lames serrées blanches puis carnées pâles – Bulbe marginé – Spores blanches

Lycoperdon cf umbrinum – Essart & Roux, p.1044

Lycoperdon perlatum – bon, p.304 - C

Lycoperdon piriformis – Bon, p.304

Macrolepiota mastoidea – (Lépiote mamelonnée) - Court., N°712 – Chapeau avec écailles brunes sur fond crème - Anneau complexe, épais, souvent double, à face inférieure fréquemment brune. Odeur de beurre fondu

Marasmius ramealis – Bon, p.176 – Petit chapeau plat, crème grisâtre – Chair tenace, pâle, tenace, insipide – Sur brindilles de feuillus

Melanoleuca cognata – Bon, p.164 – Lames saumon

Mycena alcalina « stipata » - Bon, p.184 – Chapeau campanulé, brun gris à marge striée – Lames ascendantes – Odeur alcaline forte

Mycena crocata – Bon, p.180 – Chapeau gris blanchâtre lavé d'orangé brunâtre – Lames vite teintées d'orangé – Stipe lavé d'orangé par le lait safrané vif – Sous hêtres

Mycena cyanorrhiza – (Mycène à base bleue)- Chapeau avec pellicule gélatineuse séparable - Stipe blanc à base bleu vif et renflée – Sur bois pourri de conifère

Mycena epipterygia – Bon, p.182 – Chapeau campanulé, brun grisâtre à jaunâtre, à marge crénelée ou festonnée – Revêtement visqueux – Stipe visqueux jaune citrin pâle

Mycena filopes – Bon, p.182 – Chapeau gris brun sombre au disque à marge striée plus claire – Odeur d'iode surtout en séchant- Dans la mousse souvent

Mycena galericulata – Bon, p.184 – En touffe – Saveur et odeur farineuse

Mycena galopus – Bon, p.180 – Carpophore allant du blanc au noir – Lait abondant blanc – Odeur faible raphanoïde

Mycena inclinata – Bon, p.184 – En touffe – Saveur et saveur de bougie

Mycena polygramma – Bon, p.184 – Pied finement strié de grisâtre – inodore

Mycena pura – Bon, p.180 – Court., N°601 – Chapeau blanc à brun à brunâtre violeté ou rose lilas bleuté – Stipe concolore – Odeur raphanoïde – Conifères mêlés – Tox – Sous les hêtres pour la variété rosea

Mycena vitilis – Bon, p.184 – Chapeau prumineux ridulé, beige grisâtre à brunâtre – Pied fin, beige de corne, résistant à la traction longitudinale, se brisant par un petit bruit sec

Oudemansiella mucida – Bon, p.170 – Chapeau blanc hyalin, visqueux, ridé – Lames espacées – Stipe blanc à anneau muqueux – Sur tronc mort ou branche de hêtre

Oudemansiella radicata – « Xerula » - « Hymenopellis » - Court., N°629 – Chapeau ocracé, visqueux, glabre – Stipe profondément radicant, épaissi au collet

Phellinus sp – Résupiné, peut-être punctatus ou ferruginosus, sur la face infère d'un tronc mort couché

- Plicaturopsis crispa** – Bon, p.322 – Petits chapeaux en forme d'éventail brun-jaune – Hymenium blanchâtre plissé radialement
- Pluteus cervinus** – Bon, p.196 – (Plutée couleur de cerf) – Odeur raphanoïde légère
- Pluteus griseopus** - Court., N°883 – Essart., p.260 - Chapeau brun-gris – pied gris
- Pluteus phlebophorus** – Bon, p.198 – Ressemble à *Pluteus romelli* sans trace de jaune, avec un chapeau brun, à revêtement veiné
- Pluteus romelli** – Bon, p.198 – Chapeau brun mat, un peu granuleux avec un stipe jaune vif
- Postia (Tyromyces) caesia** – Bon, p.316 – Chapeau blanc grisâtre à reflets bleutés
- Psathyrella conopilus** – Bon, p.266 – Chapeau campanulé, strié, hygrophane, brun sombre Ponctué de noirâtre – Lames brunâtres à reflets purpurins – Long stipe
- Rickenella fibula** – Bon, p.128 – Petit Chapeau très ombiliqué, orangé vif – Lames longuement décurrentes, orangé pâle – Stipe concolore – Dans les mousses
- Ripartites metrodii** – Bon, p.146 – Chapeau vite déprimé et omphaloïde, cuticule blanchâtre à l'état frais, fibrilles radiales visibles à la loupe – Lames un peu décurrentes, espacées, d'un rose pâle – Sporée brunâtre contrairement aux clitocybes blancs
- Russula cavipes** – Bon, p.72 – Espèce âcre fragile – Chapeau souvent bleu-lilas , violet-rose – Lames blanches, jaunissantes – Stipe blanc, creux, jaunissant ou couleur rouille en allant vers le bas – Odeur de safran – Sous épiceas surtout
- Stopharia caerulea « cyanea »** - Court., N°1268 – Chapeau visqueux bleu-verdâtre puis jaunâtre – Nombreux cordons mycéliens blanc-bleuté-verdâtre – Chair bleutée à ocracée
- Stropharia semiglobata** – Court., N°1271 – Chapeau visqueux, brillant, couleur paille à ocre – Lames très larges – Stipe à anneau glutineux vite apprimé, noirci par les spores
- Tremiscus helvelloïdes** – Bon, p.324
- Tricholoma album** – Bon, p.150 – Carpophore blanc, chair blanche, odeur aromatique farineuse ou de gaz d'éclairage - Saveur âcre
- Tricholoma orirubens** Bon, p.154 – Chapeau fibrilleux, à marge qui rougit – Arêtes des lames rougissantes – Base du pied bleu-vert ou jaunâtre par le mycelium - C
- Tricholoma saponaceum** – Bon, p.150 – Odeur savonneuse - Pied à rosissement basal
- Tricholomopsis rutilans** – Bon, p.150 – Sur bois mort de conifère
- Xerula pudens** – « Oudemansiella »(Collybie à poils ras) Court., N°628 – Chapeau velouté, gris brun à gris sombre – Lames larges, peu serrées et blanches – Stipe radicant, hérissé, strigieux, assez coriace
- Xylaria filiformis** – BK1, N°348 – Fructification filiforme, sur plantes herbacées
- Xylaria hypoxylon** – Bon, p.334
- Xylaria polymorpha** – Bon, p.334

Lieu dit Prés Jacquin le 12.10.2019 - Matin: Forêt de sapins, épicéas, et différents feuillus : hêtres, chênes, frênes, charmes, noisetiers, érables sycomores et champêtres ...

- Amanita muscaria** – Bon, p.296
- Armillaria bulbosa « gallica »** - Court., N°317 – Chapeau brun ochracé squamuleux - Lames comme mellea – Stipe bulbeux, clavé, jaune brun, fibrillo floconneux de jaune vif à jaune grisâtre
- Armillaria mellea** – Court., N°313 – Chapeau brun olive à jaune avec fines squamules brunes labiles – Lames subdécurrentes vite tachées de brunâtre – Stipe cylindracé ocre jaunâtre – Anneau membraneux – Rhizomorphes noirs brillants entre le bois et l'écorce
- Calciporus piperatus** – Bon, p.44 – Petit-moyen – Chapeau jaunâtre à base jaune vif - Pores concolores – Pied subconcolore mais plus jaunâtre en haut . Très poivré
- Calocybe chryseron** – Bon, p.166 – Chapeau subvelouté, jaune vif, fauvâtre au centre – Lames très serrées jaunes – Stipe concolore - Chair jaune - Odeur farineuse et saveur amarescente
- Calvatia utriformis** – Bon, p.304 – Exopériidium blanc crème – Carpophore pouvant mesurer 10cm en largeur et hauteur, sa base est stérile et courte – Ornémentations polygonales ou verrues pyramidales se tassant – La gléba passe du blanc au jaune puis au brun olivacé pour devenir pulvérulente – C

- Clitocybe decembris** – Court., N°310 – Chapeau convexe à centre déprimé, couleur brunâtre pâle au sec sauf dans la dépression qui reste brun – Stipe grisâtre pâle brunissant vers la base
- Clitocybe gibba** – Bon, p.134 – Voir récolte du 11.10.2019
- Clitocybe nebularis** – Bon, p.136 – Odeur forte de pleurote ou de poulailler
- Clitocybe odora** – Bon, p.136 – Chapeau peu déprimé de couleur verte pâle Lames et stipe entre le blanc et le verdâtre – Odeur forte anisée – C
- Clitocybe phaeothalma** – Bon, p.140 – chapeau gris brunâtre terne, tendant à devenir blanchâtre en séchant, peu déprimé avec une marge un peu flexueuse, fortement striée par l'humidité – Pied lisse – Odeur de poulailler ou de plume mouillée
- Clitocybula lacerata** – Bon, p.130 – Voir récolte du 11.10.2019
- Clitopilus prunelus** – Bon, p.188 – Voir récolte du 11.10.2019
- Collybia confluens** – Bon, p.178 – Voir récolte du 11.10.2019
- Collybia peronata** – Bon, p.178 – Chapeau ochracé brunâtre, jaune – Lames peu serrées concolores – Stipe concolore recouvert d'une laine hirsute jaunâtre à partir de la base – Odeur vinaigrée et saveur poivrée
- Cortinarius citrinus** – BK5, N°199 – Chapeau jaune vert foncé taché de brun au centre, marge infléchie, cuticule débordante – Surface visqueuse par imbibition, soyeuse et luisante par temps sec – Lames vert olivacé puis brune olivacées – Stipe jaune vert, feutré, marginé
- Cortinarius claricolor** – Bon, p.206 – Chapeau charnu, jaune pâle, un peu plus de roussâtre vers le centre, avec marge palie par le voile blanc, floconneux – Lames blanches ou café au lait pâle – Stipe blanchâtre et laineux –
- Cortinarius elegantior** – Bon, p.212 – Chapeau variant du jaune sale au fauve orangé ou olivâtre avec au centre des plaques blanchâtres – Lames jaune à brun olive – Stipe jaune paille à bulbe marginé
- Cortinarius frodulosus « argutus »** – BK5, N°188 - Chapeau blanc devenant ochracé pâle – Lames brun crème largement émarginées – Chair blanchâtre virant au jaunâtre - Stipe cylindrique recouvert ou guêtré d'un voile blanc – Odeur terreuse ou de moisi, de sueur des pieds
- Cortinarius odorifer** – Court., N°1188 – Chapeau brun roux à cuivré – Lames citrin olivâtre – Stipe jaune verdâtre à brunâtre, rougeâtre au-dessous de la marge – Chair jaune verdâtre à roussâtre – Odeur d'anis ou de fenouil
- Cortinarius uraceus** – BK5, N°379 – Chapeau conique puis campanulé, étalé aplani, souvent ondulé sinueux, hygrophane, mate, brun ochracé par temps sec et brun olivacé foncé par temps humide, il a tendance à noircir ensuite – Lames brunes, larges et echanrées – Stipe brun, gris, crème, vert – Odeur d'herbe ou de rance
- Cortinarius varicolor** – Bon, p.208 – Chapeau violacé avec marge fibrilleuse ou vergetée – Lames violacées – Stipe chiné de brun violacé fugace à sa base – Chair subconcolore à forte odeur terreuse – Conifères (Sapins – épicéas) - C
- Cortinarius varius** – Bon, p.206 – Chapeau jaune fauve à orangé vif – Lames lilacin vif au début – Stipe clavé avec une zone annulaire rouille orangé et bracelets pâles, fugaces – Odeur faible – sous conifères (sapins – épicéas) – C
- Cystoderma amiantinum** – Bon, p.172
- Entoloma nidorosum** – Bon, p.192 – Chapeau brun jaunâtre palissant à blanc terne – Chair pâle dont l'odeur est nitreuse ou chlorée
- Ganoderma carnosum** – E. Gerhardt, p.548 – BK2, N°426 - Carpophore annuel plus ou moins pédonculé – Chapeau brun-roux à noirâtre (acajou) puis uniformément foncé, plus foncé que chez lucidum – Pores arrondis fins(2-4/mm mais moins fins que chez lucidum (4-6/mm) – Apparaît sur sapin surtout tandis que lucidum se fixe sur feuillu
- Gloeophyllum odoratum** – BK2, N°392 – Fructification noduleuse, pulvinée, turbinée, en forme de console dimidiée ou en série, largement fixé au substrat – Surface piléïque ondulée, mat feutrée comme une peau de daim, jaune brun à orange brun – Marge noduleuse, sinueuse – Face inférieure porée jaune virant au gris-brun – Consistance subéreuse – Odeur de fenouil, anis, pain d'épice
- Gymnopilus sapineus** – Bon, p.244 – Chapeau squames fauves sur fond jaune – Lames jaunes tachées de rouille – Stipe jaunâtre fibrillo.laineux – Inodor et amarescent
- Hebeloma sp

- Hydnum rufescens** – Court., N°77 – Plus petit que *Hydnum repandum* (pied de mouton) – Chapeau roux à stipe plus central
- Hygrophorus pudorinus** – Bon, p.114 – Voir récolte du 11.10.2019
- Hypholoma fasciculare** – Bon, p.252 – Lames grisâtres – Saveur douce – C
- Hypholoma capnoïdes** – Bon, p.252 – Lames verdâtres – Saveur amère - Tox
- Inocybe fraudans** bon, p.236 – Chapeau convexe, fibrilleux, blanchâtre à blond doré – Stipe subconcolore – Odeur d'alcool de poire
- Inocybe geophylla** – Bon, p.240 – Chapeau lisse, blanc – Lames couleur terreuse – Stipe blanc fibrillo-soyeux – Chair à odeur spermatique – Tox
- Lactarius pallidus** – Bon, p.84 – Chapeau viscidulé, crème rosâtre pâle – Lames blanches à crème pâle – Stipe assez vite creux, viscidulé – Chair blanche puis roussâtre – Lait âprescent – Sous hêtre
- Lactarius salmonicolor** – Bon, p.80 – Lié au sapin – stipe avec strobicules – Ne verdit pas
- Lactarius strobiculatus** – Bon, p.82 – Grosse espèce avec chapeau jaune roussâtre plus ou moins zoné – Chair blanche vite jaunie à la coupe par le lait – Stipe court, couleur blanc crème et orné de strobicules jaune ochracé
- Lepiota cristata** – Bon, p.284
- Lepista inversa** – Bon, p.142 – Chapeau de couleur fauve ou d'orangé rouillé, en entonnoir – Lames serrées très décurrentes – Pied subconcolore – Chair un peu élastique – Odeur faible - Sous conifères. Ne pas confondre avec *Clitocybe amoenolens* – Essat & Roux, p.574, qui a une odeur forte de fleur d'oranger ou de poire comme *inocybe fraudans* et qui provoque de terribles douleurs aux extrémités des membres
- Lycoperdon perlatum** – (vesse de loup perlée) Bon, p.304 – Carpophore en massue, blanc puis brunâtre, parsemé d'aiguillons pyramidaux – Suite à la perte des aiguillons des aréoles (cercles pigmentés autour du mamelon) sont visibles – Présence d'un petit mamelon au sommet – Gléba blanche, jaune, verte
- Lyophyllum sp**
- Macrolepiota mastoïdea** (Lépiote mamelonnée) – Court., N°712 – Mamelon très net beige à ochracé pâle – Lames qui laissent une zone libre lisse autour du pied - Anneau complexe
- Marasmius oreades** – Bon, p.174 – Chapeau à marge crénelée, crème – Lames espacées, crème – Stipe fibrilleux, tenace, pouvant se tordre sans se briser, subconcolore – Odeur coumarinique – C
- Mycena galericulata** – Bon, p.184 – Chapeau, 4-7 cm, revêtement mat et ridulé, gris beige pâle à blanchâtre – lames interveinées souvent à reflet rosé – Stipe comprimé, sillonné, raide, lisse, grisâtre, souvent radicant – En touffe sur souche - Odeur et saveur farineuse
- Mycena inclinata** – Bon, p.184 – Voir récolte du 11.10.2019
- Alocera B**
- Noter que *Russula emetica* vient sous *Epiceas* alors que *frageticola* vient sous Chênais-hêtraies
- Oudemansiella mucida** – Bon, p.170 – Voir récolte du 10.11.2019
- Pholiota astragalina** – Court., N°1252 – Chapeau ochracé, abricot puis briqueté – Lames serrées et étroites, jaunâtre saumoné – Stipe avec une zone annulaire fugace, fibrillo floconneux sur fond de jaune orangé pâle – Sur bois pourri de conifères
- Pholiota flammans** – Court., N°1251 –
- Phlotina aporos** – Court., N°1315 – Chapeau 3 cm – Mat, brun rouillé à ochracé avec marge striolée - Lames ventruées, ocre rouillée – Stipe, fibrilleux argenté sur fond brunâtre, avec anneau fragile
- Pluteus cervinus** – Bon, p.196 – Chapeau convexe ou mamelonné, lisse à ridé à partir du disque, brunâtre – Lames ventruées, blanches puis rosées, serrées – Stipe épaissi à la base, blanc à fibrilles brunes – Odeur de rave – Sur bois mort
- Ramaria abietina** – BK2, N°458 – Fructification naissant d'une base commune et se ramifiant en plusieurs branches - Blanc crème – Les rameaux sont denses, serrés de couleur jaune clair, puis ochre olivacé verdissant au froissement – Sur humus de bois de conifères (épiceas)
- Ramaria formosa** – (Clavaire jolie) Bon, p.309 – Tronc souvent épais rappelant *Ramaria botritis* – Rameaux rose orangé saumonés à extrémités jaune – Chair blanche, vineuse à la coupe, amère – Purgatif
- Ricphorakenella fibula** – Bon, p.128 – Voir récolte du 11.10.2019

Ripartites metrodii – Bon, p.146 – Chapeau vite déprimé et omphaloïde, cuticule blanchâtre à l'état frais, fibrilles radiales visibles à la loupe – Lames un peu décurrentes, espacées, d'un rose pâle – Sporée brunâtre contrairement aux clitocybes blancs

Russula cavipes – Bon, p.72 – Espèce âcre et fragile – Chapeau bleu-lilas, violet-rose – Lames blanches jaunissantes – Stipe blanc jaunissant ou couleur rouille en allant vers le bas – Odeur de safran – Sous épicéas surtout

Russula emetica var. frageticola – Bon, p.70 – Chapeau à cuticule rouge vermillon, séparable mais à chair rosée en dessous contrairement à *Russula emetica* dont la chair sous-cuticulaire reste blanche – Lames blanches – Odeur un peu fruité ou de coco – Saveur âcre.

Russula fellea – Bon, p.78 – Chapeau couleur ochracé roussâtre – Les lames et le stipe sont subconcolore en plus pâles – Chair ochracée immuable – Saveur âcre, odeur de pomme cuite ou de pelargonium – Sous Hêtre surtout

Russula integra – Bon, p.66 – Chapeau charnu brun-jaunâtre, purpurin, très versicolor – Lames espacées, épaisses, crème puis ocre-jaune – Stipe blanc puis ocracé brunâtre – Odeur fruité faible – Saveur de noisette, douce – Sous conifères

Russula nauseosa – Bon, p.62 – Petite, à chapeau cannelé, violacé, brun vineux ou brun olivâtre – Lames assez espacées, crème puis jaune-orangé – Chair un peu âcre au début puis douce - Sous épicéas

Russula queletti – Bon, p.74 – Chapeau purpurin-rosé souvent décoloré en brun verdâtre – Lames crème – Pied rouge carminé, de radis – Odeur de compote de pomme comme *R. fellea* – Saveur assez âcre – sous épicéas

Sarcodon imbricatum – Court., N°73 – Bon, p.310 - Chapeau brun, avec des grandes écailles concentriques, très déprimé- Hyménium à aiguillons décurrents blanchâtres puis concolores – Pied subégal ou à base atténuée, fibrilleux, blanchâtre à subconcolore - Sous conifères

Trichaptum abietinum (Tramète lilas) – Court., N°96 – Résupiné puis réfléchi, très confluent – Chapeau mince, hirsute, gris à bord violet – hyménium violet – Pores laciniés, amples – Sur conifères (rare sur feuillu d'après E. Gerhardt)

Tricholoma lascivum – Bon, p.150 – Chapeau beige ochracé – Lames blanches puis roussâtres pâles - Odeur de fleur d'oranger, chèvrefeuille, avant d'être terreuse – Saveur faible

Tricholoma lascivum – Court., N°367 – Chapeau crème beige puis ocre pâle – Lames peu serrées blanches puis roussâtre pâle – Pied blanchâtre roussissant – Odeur de seringat, chèvrefeuille, oranger

Tricholoma orirubens – Bon, p.154 – Chapeau à revêtement fibrilleux, gris brunâtre à noirâtre à la marge qui rougit – Lames blanches dont les arêtes rougissent – Stipe blanc, un peu clavé, - Taches basales bleu-vert par le mycélium et rosissement de la chair extérieur et intérieur

Xerula pudens « Oudemansiella » - Court., N°628 – Voir récolte du 11.10.2019

Xerula radicata « Oudemansiella » - Court., N°629 – Voir récolte du 11.10.2019

Chemin qui mène à la Cascade du Hérisson le 12.10.2019 – Après-midi – Mélange de feuillus et de conifères – Notons la présence d'aulnes et de saules ajoutée aux listes nommées plus haut

Armillaria bulbosa - « gallica » - Court., N°317 - Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin

Clitocybe nebularis - Bon, p.136 - Voir récolte du 11.10.2019

Clitocybe phyllophila – Bon, p.136 – Voir récolte du 11.10.2019

Cortinarius atrovirens - - (Cortinaire vert foncé) - Court., N°1193 - Voir récolte du 11.10.2019

Cortinarius cf multiformis « allutus » - BK4, N°184 – Surface lisse sèche par temps sec, visqueuse par temps humide, jaune ochracé à brun orangé – Lames blanchâtres puis gris brun clair – Pied muni d'un bulbe plus ou moins marginé qui reste blanc alors que le reste du pied devient ochracé couvert de fibrilles longitudinales

Cortinarius duracinus (Cortinaire à pied dur)– Bon, p.218 – Chapeau brun-roux à beige – Lames café au lait cannelle – Stipe coriace, radicalement atténué vers la base – Cortine fugace – Odeur plus ou moins iodée

- Cortinarius elegantior** – Bon, p.212 - Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Cortinarius fraudulosus** « **argutus** » – BK5, N°188 - Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Cortinarius hercynicus** – Bon, p.222 – Marchand N°619 – Peu distinct de *Cortinarius violaceus*, ce dernier pousse sous les feuillus tandis que *hercynicus* sous les épicéas et sous les pins – L'examen microscopique des spores et des cheilocystides montre des différences évidentes – Odeur de Caran d'ache
- Cortinarius infractus** – Bon, p.204 – Court., N°1166 - Chapeau convexe à marge brusquement infléchié – Viscidule vergeté à gribouillé de brun olive à ocre purpurin roussâtre terne – Lames gris brun olive sale – Stipe brun grisâtre plus ou moins olivâtre, bleuté – Saveur très amère
- Cortinarius varius** – Bon, p.206 - Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Echinoderma asperum** – Court., N°660 – Chapeau à écailles dressées, labiles au bord, sur fond ocre grisâtre – Lames très serrées, fourchues, pâles – Stipe fibrillo-pelucheux – L'anneau est ample, garni de flocons écailleux bruns – odeur de scléroderme – Tox
- Entoloma euchroum** – Bon, p.194 – Chapeau 2 à 3cm, bleu violacé vif, fibrilleux-feutré – Lames assez espacées, bleu vif puis gris-bleu – Stipe fibrilleux, bleu à gris bleu – Saveur douce – Odeur fruitée, spermatique – Sur bois mort de feuillu
- Geastrum triplex** – Court., N°1718 – Exopéridium beige brunâtre, épais, rompu en épaisseur et ouvert en étoile de 5 à 8 branches recourbées dessous. Endopéridium sphérique, sessile, brunâtre, à péristome fibrilleux, cerné d'une aréole claire subdéprimée
- Gloeophyllum odorarum** – BK2, N°392 – Voir récolte Pré Jacquin le 12.11.2019
- Hebeloma radicosum** – Bon, p.230 – Chapeau charnu, crème brunâtre, visqueux avec des restes de voile – Lames pâles argilacées – Stipe long se prolongeant par une « racine » - Existe aussi un anneau déchiqueté beige sale et quelques restes de voile sous cet anneau – Odeur d'amande amère
- Hygrophore pudibondus** – Bon, p.114 - Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Inocybe geophylla** – Bon, p.240 – Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Lentinellus cochleatus** Var. *Inolens* – Essart. & Roux – p.966 – En entonnoir, non tordu sur lui-même, beige ochracé à fauve incarnat – Lames fortement décurrentes, blanches puis crèmes, à arête dentelée – Pied concolore au chapeau, sillonné longitudinalement – Chair coriace dont la saveur douce devient un peu piquante après 2 minutes de mastication
- Lepiota cristata** – Bon, p.284 – Court., N°674 – Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Lepista irina** – Bon, p.144 – Chapeau crème saumon, à marge enroulée – Lames serrées concolore au chapeau – Stipe subconcolore puis rayé de fibrilles brunissantes depuis la base – odeur d'iris ou de violette, fleur d'oranger – Saveur douce – C
- Leucogaricus leucothites** (lépiote pudique) – Bon, p.288 – Chapeau blanc au disque à peine ochracé à la fin, fibrilleux-soyeux – Lames blanches puis crème parfois – Stipe blanc avec anneau coulissant - Chair blanche
- Russula queletii** – Bon, p.74 – Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin
- Stropharia aeruginosa** – Bon, p.250 – Chapeau visqueux vert bleuté plus ou moins jaunissant, à marge floconneuse blanchâtre – Lames gris violacé sombre avec l'arête pâle – Stipe verdâtre à squames blanches et anneau floconneux – Odeur et saveur herbacées
- Stropharia coronilla** – Bon, p.250 – Chapeau jaune ochracé vif ou orangé – Lames lilacines puis violacées à arête pâle – Stipe blanc avec anneau
- Tremiscus helvelloides** « *Guepinia* » – Bon, p.324 – Carpophore en cornet, spatulé, lobé en gouttière, prumineux, rosé roussâtre – Face inférieure rugueuse
- Tricholoma atosquamosum** – Bon, p.154 – Chapeau squamuleux de gris sépia sombre ou bistré noirâtre sur fond pâle à marge costulée ou laineuse – Lames blanc terne – Stipe blanchâtre, plus ou moins squamuleux (entièrement concolore dans la var. *Squarrulosum* – Odeur farineuse, poivrée ou de basilic
- Tricholoma vaccinum** (couleur de vache) – Bon, p.158 – Court., N°401 - Chapeau brun chaud squamuleux-laineux à marge appendiculée – Lames crème tachées de roussâtre – Stipe à base fibrilleuse subconcolore – Odeur herbacée – Saveur un peu amère
- Xerula pudens** – Court., N°628 – Voir récolte Pré Jacquin le 12.10.2019, le matin